

# Coronavirus (COVID-19) – Merkblatt Nr. 2 (BewohnerInnen) Version 3

## Bei begründetem Verdacht oder mit einer bestätigten COVID-19 Infektion

Fragestellung	Massnahme
Erkrankung der Atemwege / Atemnot und Fieber, Muskelschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns, Magen-Darm-Erkrankung <b>oder enger Kontakt</b> zu einem bestätigten symptomatischen Fall zum Zeitpunkt des Kontakts	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Telefon an zuständigen Arzt und Standortleitung, siehe auch <a href="#">Pikettplan</a></li> <li>■ Arzt interviewt die Pflegenden konkret zu den Verdachtskriterien und verordnet die nachgelagerten Massnahmen. Möglichst kein Arztbesuch vor Ort! <a href="#">K:\ZZ00 Allgemein\90 Hygienekommission\Pandemie_Coronavirus\04 Merkblätter Pandemie\Behandlungsprozess.pdf</a></li> </ul>
Verdachtskriterien sind <b>nicht</b> erfüllt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gem. Standardhygiene <a href="#">K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\2 Standardmassnahmen</a></li> <li>■ Soziale Distanz wahren</li> </ul>
Verdachtskriterien sind erfüllt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gemäss gelber Karte vorgehen <a href="#">K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\1.1. Übersicht\Gelbe Karte Corona.pdf</a></li> <li>■ Nasen-Rachenabstrich und Rachenabstrich wird durch den Arzt verordnet. Der Arzt entscheidet wer den Abstrich durchführt (MPA oder Pflege) (mit einer chirurgischen Gesichtsmaske, Schutzbrille, Schutzkittel und Handschuhen), <a href="#">K:\ZZ00 Allgemein\90 Hygienekommission\Pandemie_Coronavirus\04 Merkblätter Pandemie\COVID_Abwesenheit HA MPA.pdf</a></li> <li>■ Laborergebnis abwarten</li> <li>■ Arzt füllt Meldeformular aus</li> </ul>
Schutzmassnahmen für Mitarbeitende	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chirurgische Maske, Schutzbrille, Überschürzen, Handschuhe</li> <li>■ FFP2-Maske bei möglichen Expositionen mit respiratorischen Sekreten (zB. Absaugen, NIV)</li> <li>■ Händedesinfektion vor/nach Anziehen/Ausziehen der Maske</li> </ul>

<b>Tragdauer der Masken</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Chirurgische Maske 8h, wenn sie feucht sind wechseln</b></li> <li>■ <b>FFP2-Masken, können von einer Mitarbeiterin während einer ganzen Schicht getragen werden (mind. 30 min über die aerosol-generierende Massnahme hinaus und solange die Betroffene im Zimmer ist). Via Staols beziehbbar.</b></li> </ul>
Besucher	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nur wenn zwingend erforderlich (nach Absprache mit Staol)</li> <li>■ Falls Besuche dringend indiziert: gleiche Schutzmassnahmen wie Mitarbeitende</li> </ul>
Bewohnerbewegungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beschränkung auf absolut notwendige Untersuchungen</li> <li>■ Chirurgische Maske für Betroffene Personen ausserhalb des Bewohnerzimmers</li> </ul>
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\3.5 Reinigung\3.5.1_Vorgehen_Infektionen.pdf</a></li> </ul>
Wäsche, Instrumente, Geschirr, Abfall	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <a href="#">K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\1.1. Übersicht\1.1.7. Norovirus Coronavirus gelbe Karte.pdf</a></li> <li>■ <a href="#">K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\1.1. Übersicht\1.1.2. Übersicht spez Hygienemassnahmen auf einen Blick.pdf</a></li> </ul>
Aufhebung der Isolation	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Frühestens 10 Tage nach Auftritt Symptome und mind. 48 Std. ohne Symptome, der Nachweis eines negativen Covid-19-Tests ist zwingend notwendig</li> </ul>