

Vorübergehende Vorsichtsmassnahmen Coronavirus (COVID-19) – Merkblatt Nr. 2

Bei begründetem Verdacht oder mit einer bestätigten COVID-19 Infektion

Fragestellung	Massnahme
Schutzmassnahmen für Mitarbeitende	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chirurgische Maske, Überschürzen, Handschuhe ■ Zusätzlich Augenschutz/Schutzbrille bei möglichen Expositionen mit respiratorischen Sekreten (zB. Absaugen, NIV) ■ Händedesinfektion vor/nach Anziehen/Abziehen der Maske
Tragdauer der Masken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Chirurgische Maske 2 – 4 h (bis zu 8h), auch wenn sie feucht sind ■ FFP2-Masken, können von einer Mitarbeiterin während einer ganzen Schicht getragen werden (mind. 30 min über die aerosol-generierende Massnahme hinaus und solange die Betroffene im Zimmer ist). Via Staols beziehbar.
Besucher	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nur wenn zwingend erforderlich (nach Absprache mit Staol) ■ Falls Besuche dringend indiziert: gleiche Schutzmassnahmen wie Mitarbeitende
Bewohnerbewegungen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beschränkung auf absolut notwendige Untersuchungen ■ Chirurgische Maske für Betroffene Personen ausserhalb des Bewohnerzimmers
Reinigung	<ul style="list-style-type: none"> ■ K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\3.5 Reinigung\3.5.1 Vorgehen Infektionen.pdf
Wäsche, Instrumente, Geschirr, Abfall	<ul style="list-style-type: none"> ■ K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\1.1. Übersicht\1.1.7. Norovirus Coronavirus gelbe Karte.pdf ■ K:\AA01 Handbücher und Konzepte\90 Hygienekonzept\1.1. Übersicht\1.1.2. Übersicht spez Hygienemassnahmen auf einen Blick.pdf
Aufhebung der Isolation	<ul style="list-style-type: none"> ■ Frühestens 5 Tage nach Auftritt Symptome und mind. 24 Std. ohne Symptome, der Nachweis eines negativen Covid-19-Tests ist nicht zwingend notwendig